

<div style="text-align: justify;">

 <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: justify;"> <blockquote>

Cvetovi orhidej Cattleya so izredno veliki in zato tudi zelo vpadljivi. So bogatih barv in e posebej okraeni s poudarjeno ustnico. Zraven nekje 60-tih vrst obstaja e veliko zelo atraktivnih variacij in kriancev. Ta njihova sposobnost spreminjanja, ki je povezana e z veliko sposobnostjo za krianje, je popeljala orhideje Cattleya do ene izmed najpomembnejih orhidej za gojitelje e ne samo rastlin ampak tudi za namen rezanega cvetja.</blockquote> </div> </div> </div> <div style="text-align: justify;">
V domovini rastejo Cattleye najvekrat epifitsko na vejah ali deblih dreves, visoko v njihovih krošnjah. V glavnem razlikujemo dve obliki rasti pri teh orhidejah in sicer ozke, bolj ploate pseudobulbe z enim listom ter takne z dvema listoma. Posebnost pri Cattleyah je tudi njihovo oblikovanje cvetnega poganjka. Na vrhu pseudobulbe, kjer se oblikuje tudi list, zraste tako imenovana spathe (noonica). Iz te spathe potem zraste krajne cvetno steblo (odvisno od kriancev lahko tudi dalje) na katerem se razvije cvet. Zaradi svoje sposobnosti krianja, gojitelji oblikujejo tudi nove kriance med razli?nimi, Cattleyam podobnimi vrstami in tako nastajajo krianci ve?ih vrst kot je na primer Brassocattleya, Brassolaeliocattleya, Epicattleya, Potinara, Sophrolaeliocattleya.

 Domovina: Srednja in Ju?na Amerika, podro?je Karibov

 Temperaturno obmo?je: temperirano do toplo. Predvsem krianci kot Brassolaeliocattleya, velikokrat potrebujejo bolj toplo.

 ?as cvetenja: Glede na vrsto in hibrid zelo razli?no. Predvsem pa vrste cvetijo najvekrat le enkrat letno, medtem ko krianci dva ali ve?krat.

 Barva cvetja: bela, rumena, roza, zelena, rde?a, oran?na, rjava, vijoli?na

 Kraj rasti: celo leto zra?no, zelo svetlo e pozimi tudi son?no. Poleti jih nikoli ne izpostavimo direktnemu soncu.

 Temperatura: poleti tokom rasti toplo 24 e 34 stopinj celzija. Pomembno je to, da mora temperatura tokom no?i vedno rahlo pasti. Tokom zimskega ?asa, pa je za ve?ino teh orhidej dovolj tokom dneva 20 stopinj celzija z minimalno no?no temperaturo okrog 14 stopinj celzija.

 Voda: Od marca do konca avgusta bogato zalivati (med zalivanji naj se substrat osu?i). V pozni jeseni zmanj?ati zalivanje, ker je e hladneje da nebi pri?lo do pojava plesni. V kolikor jih imamo v ogrevanem prostoru pri temperaturi 20 stopinj celzija redno zalivamo celo zimo in jih tudi dnevno pr?imo. Posebej pozimi moramo biti e posebej pazljivi, da zalivamo le takrat, ko se substrat e dodobra osu?i, saj je ve?ina Cattley takrat v obdobju mirovanja in bi lahko pri?lo do pojava gnilobe, v kolikor bi bile preve? mokre.

Substrat se najraje dodobra osuši preden ponovno zalijemo.
 Gnojenje: Od marca do avgusta redno gnojimo z zelo razredčenim gnojilom vsakih 5 do 7 dni. Vsaki 3. termin gnojenja izpustimo in zalijemo z večjo količino iste vode. Kadar gnojimo z močnejšo koncentracijo gnojila, gnojimo le enkrat na 4 tiri tedne. Gnojenje pozimi skoraj ni potrebno, morda za tiste ki so izpostavljene višji temperaturi enkrat na 4 tiri tedne z zmanjšano količino gnojila.
 [>](images/stories/vzgoja/vrste-krizanci/cattleya/blc_neznan-600-3.jpg "Vzgoja orhideje Cattleya - cela rastlina orhideje Cattleya; neznani križanec, najverjetneje med Brassavola, Laelia in Cattleya")

Presajanje: vsaki dve leti. Presajamo jih takrat, ko so prenehale cveteti in opazimo novo rast. Nova rast mora pri tem pokazati črne nastavke novih korenin č kar je pravi trenutek, ko je rastlina v polnem zamahu nove rasti, ko bo tudi najbolj voljna oblikovati nove korenine.
 Substrat: Cattleye rastejo večinoma epifitsko zato potrebujejo veliko zraka okrog korenin, hkrati pa njihove korenine niso tako zelo debele, zato potrebujejo tudi nekaj srednje velikih zrn.
 Razmnoževanje: razmnoževanje je najuspešnejše z delitvijo pseudobulb. Paziti moramo, da imamo vsaj tri pseudobulbe v enem delu, ki smo ga odvojili od ostalega dela.
 škodljivci, bolezni: kadar je zrak presuh se pojavijo pršice ali žužke. Cattleye zelo redko oboliijo, ker imajo tako trde liste. Vendar so pri nepravilni vzgoji zelo občutljive na gnilobo.
 Moj nasvet: V kolikor imajo popki problem pri prodiranju skozi spatho, jim lahko pomagata s tem, da samo prerežete spatho in tako osvobodite popke. Pri tem bodite previdni, da popkov ne poškodujete.
 </div>